

УТВЕРЖДЕНО  
приказом  
Государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
образования города Москвы  
"Детская музыкальная школа  
имени Н.П.Осипова"  
от 27 июня 2017 года № 88/од

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об обеспечении аптечками первой помощи**  
**в Государственном бюджетном учреждении**  
**дополнительного образования города Москвы**  
**"Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова"**

Москва, 2017

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 169н от 05.03.2011 г. "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам".

2. Аптечка находится в доступном для сотрудников образовательной организации месте – 1 этаж, кабинет 1. Все сотрудники должны быть ознакомлены с местом расположения аптечки и её комплектацией, а также перечнем состояний, при которых оказывается первая помощь и перечнем мероприятий по оказанию первой помощи.

3. Содержание аптечки проверяется еженедельно, сразу пополняется по мере расходования, отслеживаются даты годности. Ответственный за проверку комплектности и даты годности аптечки специалист по охране труда.

4. Рекомендуемый перечень вложений в аптечку согласно приложению № 1 и правила пользования аптечкой согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5. Правилами пользования аптечкой первой помощи должны быть обучены все работники школы. За своевременное обучение и качество обучения несёт ответственность руководитель образовательной организации.

### **Рекомендуемый перечень вложений в аптечку**

1. Дезинфицирующее средство (антисептик)\*
2. Гигиенические салфетки
3. Фиксирующий пластырь
4. Пластыри-пластинки разных размеров
5. Стерильные самоклеющиеся повязки на рану разных размеров
6. Гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин
7. Гидроактивные ожоговые пластыри
8. Стерильные марлевые бинты
9. Гемостатические повязки
10. Стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров
11. Эластичные фиксирующие бинты
12. Пинцет
13. Ножницы
14. Одноразовые перчатки, маски
15. Карандаш и блокнот для записей
16. Номера телефонов аварийных, спасательных служб района и города

\*Не должно быть лекарственным средством

## **Правила пользования аптечкой**

### **1. Травма**

Ушибы, переломы вывихи (боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе) – обезболить, иммобилизовать (шинами, подручными средствами, или фиксация руки к туловищу, нога к ноге), приложить холод на место травмы.

### **2. Раны и кровотечение**

а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) – наложить жгут с дозированной компрессией выше раны оставив записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку. Конечность иммобилизовать, больному дать обезболивающее.

б) Венозное ( кровь темная, не пульсирует), капиллярное – наложить на рану салфетку или насыпать порошок сатин. Сделать давящую повязку бинтом.

На рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. Мелкие раны и ссадины обработать йодом или раствором бриллиантовой зелени и заклеить бактерицидным пластырем.

### **3. Ожоги**

При ожогах наложить стерильную повязку, дать обезболивающее.

### **4. Боли в сердце**

Больному принять валидол (1 таблетка) или нитроглицерин или тринитролонг (1 таблетка), корвалол (15 капель на 50 мл воды).

### **5. Обморок**

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт на ватке.

## **6. Стрессовые реакции**

Развести 30 капель корвалола в 50 мл воды и выпить больному.

## **7. Сердечно-легочная реанимация**

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии.

Освободить ротовую полость и верхние дыхательные пути от инородных тел и жидкости. Проводить искусственное дыхание с использованием устройства и непрямой массаж сердца до прибытия медицинского работника или восстановления дыхания и пульса.

## **8. Отравления**

Промыть желудок. Развести 1 упаковку энтеродез в 100 мл воды и выпить больному или принять активированный уголь (2-3 таблетки).

## **9. Поражение глаз (травма, попадание инородных тел/веществ)**

Промыть глаз водой, закапать сульфацил-натрия (3-5 капель).